

نحوه صحیح مصرف داروی تتراسیکلین:

۱. دوره آنتی بیوتیک درمانی را به طور کامل رعایت کند. دوزهای دارو را تقریباً راس ساعت مصرف کند.
۲. دوزهای خوراکی را با معده خالی مصرف کند (یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از خوردن غذا یا نوشیدنی ها) کپسول ها را با یک لیوان پر آب خورده و از خوردن دارو در زمان خواب پرهیز کند.
۳. پوست خود را از تماس با نور خورشید محافظت کند.
۴. در صورت وقوع راش، اسهال یا هر علامت جدیدی اطلاع دهد.
۵. در هنگام تحویل دارو حتماً به تاریخ انقضاء همه تتراسایکلین ها را بررسی کنید.
۶. در صورتی که تحت درمان دراز مدت با دارو هستید گزارش فوری شروع سردرد شدید یا اختلالات

بینایی توصیه می شود. اینها نشانه های افزایش فشار داخل جمجمه هستند و قطع فوری تتراسایکلین

را جهت پیشگیری از فقدان برگشت ناپذیر بینایی ایجاب میکند.

۷. در صورت تداوم تهوع و استفراغ و زردی پوست و چشم را گزارش کند.

۸. از مصرف دارو همراه با شیر (کلسیم) خودداری شود.

۹. در صورت مصرف تتراسایکلین، لازم است از روشهای جلوگیری از بارداری مطمئن تری استفاده شود.

واحد آموزش

خرداد ۹۷

منبع: راهنمای مصرف صحیح دارو در

مراکز بهداشتی درمانی، دکتر مریم نفیسی