



بیمارستان مادر و کودک شوشتاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شیراز

خونریزی دوران بارداری

شماره سند:



تئییه تنظیم:

فهیمه باغبانی ، کارشناس ارشد مشاوره در مامایی

تایید کننده علمی:

دکتر طیبه عزیزی، متخصص زنان و زایمان

زیر نظر واحد آموزش سلامت- بهار ۱۴۰۱

منبع:
بارداری و زایمان ویلیامز

لکه بینی یا خونریزی در زمان بارداری به خصوص در سه ماهه اول بارداری امری غادی است و معمولاً هم دلیل خاصی ندارد اما به دلیل اینکه در بعضی مواقع این خونریزی‌ها شدید یا با دلایل همراه است بنابراین شناخت این دلایل و مراجعه به پزشک در حفظ سلامت مادر و جنین ضروری به نظر می‌رسد.

خونریزی در سه ماهه اول

حدود بیست درصد از بانوان در طول سه ماهه اول بارداری و در طول ۱۲ هفته اول نشانه‌هایی از لکه بینی مشاهده می‌کنند که دلایل مختلفی دارد.

خونریزی به دلیل وجود جنین:

در طول ۱۲ روز بعد از آبستن ممکن است که شخص لکه‌هایی را مشاهده کند و فکر کند که همانند لکه‌های دوران پریودی هست در واقع آنها هتوز متوجه بارداری نشده‌اند. این خونریزی به دلیل جایگزینی جنین اولیه در رحم است که به صورت لکه بینی بوده و بیشتر از چند روز و چند ساعت نخواهد بود.

سقط جنین

بیشترین دلیل نگرانی مادران باردار از خونریزی در طول ۱۲ هفته اول دوران بارداری به سقط جنین بر می‌گردد. در این دوره زمانی حدود نیمی از بانوان که در این زمان خونریزی داشته اند نهایتاً جنینشان را سقط می‌کنند اما دلیل نمی‌شود که در هر لکه بینی ناچیزی شخص دچار نگرانی شود. مخصوصاً اگر علائم دیگری

نداشته باشد، در موارد ادامه خونریزی یا لکه بینی به خصوص اگر همراه با درد زیر دل باشد حتماً با پزشک خود مشورت کند.

بارداری خارج رحمی:

در بارداری خارج رحمی، جنین در خارج از رحم که در اکثر مواقع در لوله رحمی است رشد می‌کند. اگر جنین در همین وضعیت به رشد خود ادامه دهد در نهایت منجر به ترکیدن لوله رحمی می‌شود که برای مادران بسیار خطرناک است. اگرچه این نوع بارداری خیلی خطرناک است اما تنها در دو درصد بانوان اتفاق می‌افتد. کی دیگر از علائم بارداری خارج رحمی درد شدید زیر شکم همراه یا گیجی شدید می‌باشد.

بارداری توده‌ای یا مول

در شرایطی بسیار نادر توده‌ای درون رحم به جای جنین شروع به رشد می‌کند و در شرایط بسیار نادر نیز این توده می‌تواند سرطانی شده و به قسمتهای دیگر بدن گسترش یابد. یکی دیگر از علائم بارداری توده‌ای حالت تهوع و استفراغ شدید و بزرگ شدن سریع اندازه رحم می‌باشد.

دلایل دیگر خونریزی در دوران اولیه بارداری شامل:

تفییرات در گردن رحم:

در طول زمان بارداری جریان خون زیادی به سمت گردن رحم وجود دارد در نتیجه داشتن روابط جنسی در این دوران و یا تست

اگر این علائم قبل از هفته ۳۷ اتفاق بیفتد فوراً به پزشک مراجعه کنید زیرا در حال زایمان زودرس هستید. از دیگر علائم می‌توان به تغییرات مجرای تناسلی، فشارهای زیر شکمی و درد در ناحیه زیر کمر می‌باشد.

► از دیگر دلایل خونریزی در اواخر دوران بارداری:

آسیب در ناحیه گردنبه رحمو مجرای تناسلی-پولیپ-سرطان

خود مراقبتی:

اگر در اوخر بارداری دچار خونریزی غیر عادی شدید چه باید بکنید:

نشانه وجود یک مشکل می‌باشد/بنابراین سریعاً به پزشک مراجعه نمایید. / از یک دستمال برای این که میزان خونریزی را مشخص کنید استفاده نمایید. نوع خونریزی(رنگ صورتی، قهوه‌ای، قرمز و یا اینکه خونتان دارای لخته بوده و یا روان بوده) را مشخص کنید. طی خونریزی هر گونه بافتی که از بدن خارج شده را به پزشک نشان داده و در طول دوران خونریزی از نزدیکی خودداری کنید. در صورت مشاهده هر یک از علائم زیر به اورژانس مراجعه کنید: هر نوع درد یا پیچش در ناحیه زیر شکم/خونریزی با یا بدون درد/ خارج شدن بافت از درون رحم/سرگیجه با ضعف/تب بالای ۳۷/۸ درجه سانتی گراد/ادامه لکه بینی

► جدا شدگی جفت

در حدود یک درصد از باردارها در زمان قبل یا طول زایمان جفت از دیواره رحم جدا می‌شود که برای مادر و جنین خطرناک می‌باشد. از دیگر علائم جدا شدن جفت وجود درد در ناحیه زیر شکم و لخته خون در مجرای تناسلی و درد کمر می‌باشد.

► پارگی رحم:

ممکن است به دلیل پاره شدن رخمهای دوخته شده در سازارین بارداری قبلی اتفاق بیفتد که بسیار خطرناک است و نیاز به عمل سازارین فوری می‌باشد. از دیگر علائم احساس درد و فشار در ناحیه زیر شکم می‌باشد.

► رگ‌های سرراهم:

در موقع بسیار نادر در اثر افزایش رگهای خونی در بند ناف و جفت در طول مسیر کانال زایمان این مسیر را مسدود می‌کند که برای جنین خطرناک است. زیرا در اثر خونریزی زیاد از جفت و بند ناف ممکن است جنین دچار کمبود اکسیژن شود و خفه شود. از دیگر علائم ضربان غیر طبیعی قلب جنین و خونریزی شدید هست.

► زایمان زود هنگام:

خونریزی در اوخر دوران بارداری شاید به این دلیل باشد که جنین شما آمده به دنیا آمدن است، چند روز یا چند هفته قبل از زایمان توده مخاطی که همراه با لکه می‌باشد از رحم خارج می‌شود،

های رحمی باعث ایجاد لکه بینی می‌شود این لکه بینی نگرانی در پی خواهد داشت.

عفونت:

هر گونه عفونت در فضای درونی رحم و یا دستگاه تناسلی و یا عفونت ناشی از روابط جنسی می‌تواند باعث بروز لکه بینی یا خونریزی در سه ماهه اول بارداری شود.

خونریزی در سه ماهه دوم و پایانی بارداری:

خونریزی‌های غیرعادی در اوخر بارداری را باید جدی گرفت زیرا می‌تواند هشدار برای موارد خطرناک در مادر یا جنین باشد. اگر در طول این دوران خونریزی مشاهده گردد حتماً به پزشک خود مراجعه نمایید.

دلایل احتمالی خونریزی در دوران بارداری:

► جفت سرراهم:

این شرایط زمانی پیش می‌آید که جفت به سمت پایین متمايل شده باشد و یا جلوی کانال زایمان را می‌گیرد. البته این اتفاق بسیار نادر است و در حدود یک در دویست نفر این اتفاق می‌افتد. اما اگر هم این اتفاق بیفتد باید سریعاً اقدامات مراقبتی انجام گیرد. این نوع خونریزی بدون درد و علامت اتفاق می‌افتد.