



بیمارستان مادر و کودک شوشتری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شیراز

HPV

زگیل تناسلی

PM-ed-40-1ed

تهیه کننده:

واحد کنترل عفونت-تیر 1404

تأیید کننده: مدیر خدمات پرستاری مامایی

/سوپروایزر آموزشی

منبع: بیماریهای عفونی هاریسون

3. از طریق روابط جنسی دهانی، واژینال و یا دهانی، مقعدی

عوارض:

بیشتر عفونت های این ویروس، بدون علامت هستند و خود به خود از بین می روند، اما برخی از آنها می توانند منجر به زگیل تناسلی گردند.

اما مهمترین خطر آنها ایجاد سرطان دهانه رحم و مقعد و ... در برخی از نمونه های این ویروس می باشد

در اندام تناسلی باعث سرطان رحم، سرطان واژن و سرطان آلت تناسلی آقایان

در اطراف مقعد باعث سرطان مقعد

در دهان و گلو باعث سرطان دهان و گلو می شوند.

راه های پیشگیری از انتقال ویروس:

1. رعایت بهداشت

2. غربالگری منظم در زنان نظیر تست های اختصاصی HPV

3. واکسیناسیون علیه ویروس (واکسن گارداسیل)

4. استفاده از کاندوم

HPV یا ویروس پاپیلومای انسانی

ویروس پاپیلومای انسانی، یک ویروس شایع است که می تواند منجر به ایجاد زگیل های پوستی یا تناسلی و در برخی موارد سرطان گردد.

این ویروس 100 نوع مختلف دارد که برخی بدون علامت، برخی از آنها باعث ایجاد زگیل و برخی دیگر با انواع خاصی از سرطان دهانه رحم و مقعد و... مرتبط است



راه های انتقال ویروس:

1. از طریق روابط جنسی

2. از طریق پوست با پوست، به ویژه در نواحی تناسلی (لمس کردن زگیل می تواند باعث انتقال ویروس گردد)

به طور کلی با افزایش آگاهی از این ویروس و راه های انتقال و پیشگیری از آن ،می توانیم احتمال ابتلای خود و دیگران به آن را کم کنیم و از عوارض جدی آن در امان باشیم .



تشخیص :

آزمایش HPV

تست پاپ اسمیر

درمان :

درمان زگیل پوستی به محل قرار گرفتن آنها و میزان آزاری که به فرد می رسانند بستگی دارد .

درمان در همه موارد ضروری نیست ،به عنوان مثال :دو سوم زگیل های پوستی کودکان بدون هیچ درمانی طی دو سال خود به خود برطرف میشوند .با این وجود ممکن است زگیل در این مدت بزرگ شده و یا زگیل های جدید ظاهر شود .بیشتر افراد ترجیح می دهند زگیل خود را درمان کنند به خصوص اگر آنها دردناک و یا از نظر ظاهری آزاردهنده باشند .

در حال حاضر دارویی برای درمان قطعی این ویروس وجود ندارد و اگر عفونت منجر به مشکلات جدی شود پزشک در مورد درمانهایی نظیر لیزردرمانی،الکتروکوتر یا سوزاندن زگیل ،انجماد یا کرایوتراپی یا جراحیتصمیم گیری می کند .هرچند برخی از مکمل ها با تقویت سیستم ایمنی می توانند به روند بهبود بیماری کمک کنند

علائم : در بیشتر موارد سیستم ایمنی بدن می تواند این عفونت ویروسی را در عرض دو سال از بین ببرد و زگیل هم ایجاد نمی شود .وقتی که زگیل ظاهر می شود بسته به نوع ویروس ظاهر آن متفاوت است و می تواند شامل موارد زیر گردد ،

در زنان زگیل تناسلی به شکل برجستگی های کوچک شبیه گل کلم و یا برآمدگی ریزظاهر می شود اما می تواند در نزدیکی مقعد ،دهانه رحم و یا واژن ایجاد شود .

در مردان زگیل تناسلی روی آلت تناسلی و بیضه و یا اطراف مقعد ظاهر می شود .

زگیل تناسلی به ندرت باعث ناراحتی و یا درد می شود ، اگر چه ممکن است گاهی خارش داشته شود و یا حساس گردد .

عوامل خطر در ابتلا به ویروس :

- 1.تعدد شرکای جنسی
 - 2.ضعف سیستم ایمنی (نظیر بیماران مبتلا به ایدز)
 - 3.پوست آسیب دیده
- زگیل هایی که عجیب به نظر می رسند ، به سرعت رشد می کنند دردناک شوند ،یا با درمان بهبود پیدا نکنند .

