



بیمارستان مادر و کودک شوشتری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

شیراز

عوارض بیهوشی

شماره سند: PM-Ed-37-3ed



تهیه کننده:

واحد آموزش سلامت - تیر 1404

تأیید کننده: مدیر خدمات پرستاری مامایی

/سوپروایزر آموزشی

تأیید کننده نهایی:

منبع: ویلیامز

سرفه یکی از مکانیسم های عمده ی تخلیه ی ترشحات از راه های هوایی بزرگ است . سرعت بالای جریان هوا که جهت بیرون راندن ترشحات از راه های هوایی فوقانی ضرورت دارد بیشتر در حجم های ریوی بالا به طور موثر ایجاد می شود .

تهوع و استفراغ :

تهوع و استفراغ همراه با درد شایع ترین عوارض بعد از عمل هستند که بیماران تجربه می کنند . میزان تهوع و استفراغ بستگی به فاکتور های زیادی داشته و در 20-30 درصد از بیماران بعد از عمل احتمالاً وجود خواهد داشت .

تاخیر در بیداری :

حتی بعد از بیهوشی و جراحی طولانی پاسخ نسبت به تحریکات به طور منطقی در عرض 60-90 دقیقه قابل انتظار است . هنگام بروز تاخیر در بیداری ارزیابی علایم حیاتی (فشار خون شریانی - اشباع اکسیژنی هموگلوبین - بررسی عملکرد قلب - درجه حرارت) و معاینات عصبی حایز اهمیت است .

ی (هذیان بیداری) :

کمی از بیماران هنگام بیدار شدن از ی دچار حالت بی قراری می شوند که ممکن جهت متوقف ساختن آنها نیاز به نگهدارنده فیزیکی داشته باشند . چنین رفتاری به نظر می رسد در بیماران جوانی که نسبت به یافته ن در مورد جراحی کنجکاو می باشند

میشود که هر سال 25-20 میلیون بیهوشی در ایالات متحده انجام میشود . مرگ به علت فقط تجویز بیهوشی بسیار نادر در مورد بیماران نسبتاً سالم با جراحی ی و آسان خطر حتی کمتر است . شاید مقدار ک در پنجاه هزار تا یک در صد هزار مورد می باشد . صرفه نظر از خطر بیهوشی برآورد میشود که 50-75 در صد از مرگ های حاصل از بیهوشی قابل پیشگیری میباشند . وقتی که سوء اتفاق می افتند غالباً مشکل است که سم اصلی بروز آن را ثابت کرد . علیرغم اینکه ت مربوط به بیهوشی 4-3 درصد کل ت پزشکی را تشکیل می دهند غرامت آن ز از 10 درصد است که شدت خدمات وارد را مورد تأکید قرار می دهد . در خانم های باردار که نیاز به عمل سزارین پیدا میکنند بی حسی نخاعی نسبت به بی هوشی عمومی اولویت دارد در بی هوشی عمومی خطر تورم راه هوایی و اشکال در لوله گذاری وجود دارد . همچنین حین بیهوشی عمومی مقداری از داروی بیهوشی از طریق جفت به جنین منتقل می شود . اگرچه اغلب داروهای که برای سزارین استفاده می شوند خطری برای نوزاد نداشته و داروهای ایمنی هستند از طرف دیگر طی بی حسی مادر بیدار است و می تواند نوزاد خود را ببیند و از تجربه مادر شدن لذت ببرد .

عوارض شایع بیهوشی شامل:

سرفه:

ویا ی که از درد می ترسند بالا باشد . کاهش ن خون را ابتدا باید به عنوان عامل بیقراری گرفت.

درجه حرارت بدن :

درجه حرارت بدن یکی از عوارض انجام جراحی در اتاق های سرد می باشد . موارد ی وشل کننده های عضلانی از مکانیسم جبرانی لازم جهت جلوگیری از اتلاف حرارت ض عروق محیطی -لرز)ممانعت به عمل می

اثر مواد بیهوشی روی کار کلیه :

مواد بیهوشی می توانند به علت اثر اتشان روی گردش خون کار کلیه را تغییر دهند در موارد نادری داروهای مصرف شده در بیهوشی مستقیما ایجاد سمیت کلیوی می کنند .

عوارض ریوی بعد از عمل :

عوارض ریوی بعد از عمل پس از جراحی قفسه سینه وسایر اعمال جراحی به ویژه اعمال جراحی فوقانی شکم مشخص می شوند .

*نکته مهم :

در صورت بروز وادامه دار شدن هر یک از علایم گفته شده به پزشک مراجعه نمایید..

