



بیمارستان مادر و کودک شوشتری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

شیراز

پارگی زودرس پرده ها

شماره سند: PM-Ed-23-2ed

تهیه کننده:

واحد آموزش سلامت - تیر 1404

تأیید کننده: مدیر خدمات پرستاری مامایی

/سوپروایزر آموزشی

تأیید کننده نهایی: مسئول علمی زنان و زایمان

منبع: ویلیامز

پارگی زودرس پرده چیست؟

خروج مایع از واژن چه به صورت مداوم و چه به صورت یکباره قبل از شروع دردهای زایمانی است.

تشخیص های پارگی زودرس پرده ها :

- مشاهده مستقیم نشت مایع از واژن

- انجام آزمایش بر روی مایع نشت شده

- سونوگرافی که کاهش آب دور جنین را نشان می دهد

علت پارگی زودرس پرده ها (کیسه آب)

- عفونت های دستگاه تناسلی

- التهاب حاد جفت

خطر پارگی زودرس پرده ها در موارد زیر بیشتر است:

- سابقه پارگی زودرس پرده ها در حاملگی قبلی

- شواهد شروع روند زایمان

- سیگار

- سابقه زایمان زودرس

- عفونت باکتریایی واژن

- خونریزی از واژن به ویژه در سه ماهه سوم

عوارض پارگی زودرس پرده ها

- زایمان زودرس

- افزایش احتمال عفونت

- جدا شدن جفت

- بروز مشکلات تنفسی در جنین

علائم خطر:

- افزایش ضربان قلب جنین

- افزایش ضربان قلب مادر

- تب و لرز

- حساس شدن رحم

- ترشحات بد بو و چرکی

اقداماتی که انجام می شود:

- تجویز دارو جهت رسیدگی ریه جنین

- دادن آنتی بیوتیک به مادر جهت جلوگیری از عفونت داخل

رحمی

- بررسی تعیین بلوغ ریه جنین

-بستری مادر تا 34هفتگی وادامه یا ختم حاملگی بستگی به سن حاملگی ونظر پزشک وآزمایشات بیمار دارد

-چک علایم حیاتی مادر وبررسی مادر از نظر تب وافزایش ضربان قلب ودرد رحمی -ترشحات بد بو -عفونت خون

اقداماتی که مادر باید در چنین مواردی انجام دهد:

-درصورت بروز ترشحات چرکی وبودار -آبریزی -سوزش وخونریزی-درد پهلوی سریعا به پزشک مراجعه کنید .

-آنتی بیوتیک تجویز شده را در زمان تعیین شده استفاده نمایید
-درصورت حساس ودردناک بودن شکم وتب به پزشک مراجعه نمایید.

-رعایت بهداشت فردی

-چک حرکت جنین

-پیگیری سونوگرافی -نوار قلب جنین و آزمایشات که توسط پزشک تجویز میشود.

