




بیمارستان مادر و کودک شوشتاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شیراز

## زایمان سزارین

شماره سند:



تایید کننده علمی:

دکتر طبیه عزیزی، متخصص زنان و زایمان

واحد آموزش سلامت-پاییز ۱۴۰۰

منبع: بارداری و زایمان ویلیامز

ولی روز به روز رفته بهتر خواهد شد. پرستار شما در ابتدا هر چند ساعت یکباره به بالین شما خواهد آمد که وضع شما را کنترل کرده و به شما کمک نماید. او علاوه بر این شما را کنترل می کند شکم شما را لمس می کند تا ببیند آیا رحم شما سفت است و میزان خونریزی واژن را چک می کند.

شما دارای ترشحاتی از واژن خواهید بود که حاوی خون و بافت های اضافی کنده شده از حفره درونی رحم است. ممکن است اولین بار که از جا بر می خیزید مقدار زیادی از این ترشحات خونی دفع شوند و تا سه یا چهار روز اول به رنگ قرمز روشن خواهد بود.

همچنین پرستار به شما آموزش خواهد داد که چگونه سرفه کنید یا تمرین های منظم تنفس انجام دهید تا مایعات جمع شده درون ریه تخلیه شود این امر در صورتی که بیهوشی شما از نوع عمومی بوده حائز اهمیت است.

دقت کنید هنگام سرفه و نیز عطسه و خنده دستها یا یک بالش روی محل زخم بگذارید. اگر همه چیز رو به راه باشد سرم و سوند ادراری در عرض ۱۲ ساعت پس از عمل جراحی برداشته می شود و بعد از آن شما به محض این که میل به خوردن داشته باشید می توانید غذا بخورید.

در دو روز اول ممکن است از نفخ و تجمع گاز در شکم رنج ببرید از آنجا که حرکات روده پس از عمل جراحی کند می شود ، گاز در روده تجمع می یابد . فعالیت خود را از سر گیرید. اگر ناراحتی شما زیاد باشد پرستار به شما داروهای ضد نفخ می دهد، این دارو

### مادر گرامی:

به طور معمول بیمارانی که تحت جراحی سزارین قرار گرفته اند یک تا دو روز بعد از عمل جراحی در بیمارستان می مانند. ۳ روز بعد از عمل سزارین می توانید حمام کنید.

نیازی به پانسمان مجدد در محل برش ندارید کافی است محل را خشک نگهدارید و آنتی بیوتیک را سر ساعت به صورت خواراکی مصرف کنید.

بلافاصله پس از جراحی ترکیبات مخدوش به صورت وریدی تزریق می شود. ممکن است هر چند ساعت داروی ضد درد به صورت تزریق یا شیاف دریافت کنید.

ممکن است بلافاصله پس از جراحی احساس گیجی و تهوع داشته باشد. بسیاری از مادران در سراسر بدن احساس خارش دارند بخصوص آنهایی که از طریق اپی دورال یا اسپیپنال مواد مخدوش دریافت کرده اند. در چنین صورتی به پزشک اطلاع دهید تا داروی ضد خارش برایتان تجویز کند. اگر بخواهید نوزاد را شیر دهید می توانید در اولین فرصت ممکن این کار را انجام دهید. از پرستار بخواهید که به شما آموزش دهد چگونه در وضعیت خوابیده به پهلو به نوزاد شیر دهید.

ممکن است در محل برش سزارین احساس درد و بی حسی کنید. محل برش ممکن است کمی برآمده و برجسته بوده و از رنگ پوستتان تیره تر باشد عطسه، سرفه یا سایر فعالیت هایی که در محل شکم فشار ایجاد نماید در روز های اول درناک خواهد بود

نداهه صبر کنید ممکن است چندین ماه طول بکشد تا شما به  
حالت اول باز گردید

در عرض ۴ تا ۶ هفته و با صلاحديد پزشك می توانيد مقايرت  
جنسی را آغاز کنید. استفاده از توالت فرنگی به منظور جلوگیری  
از باز شدن بخيه ها توصيه می شود از نشستن و خم کردن زانو  
ها به مدت طولاني خودداری فرمایيد.

معمولا شروع مجدد تخمک گذاري با شروع قاعدي مشخص می  
شود و گاهی اوقات ممکن است مادر تا يك سال قاعده نشود اما  
بدانيد که تخمک گذاري و بارداري وجود دارد اگر به طور مرتب  
به فرزند خود شير دهيد معمولتا ۶ هفته و اگر به نوزاد خود شير  
ندهيد ۳ هفته پس از زايمان احتمال بارداري وجود دارد بهترین  
روش جلوگيری از بارداري مصرف فرص شيردهي می باشد که  
برروي شير دهی اثری ندارد.

### علائم خطر:

خونریزی بيش از حد قاعدي، خروج ترشحات بدبو و چركی از  
 محل خم، سوزش يا درد قرمزي ناچيه عمل، درد و ورم يك طرفه  
 ساق و ران، دور شكم و پهلو، درد، تورم و سفتی پستانها،  
 افسردگی شديد

صرف مائيات را بيفراييد تا دچار بيوسٽ نشويid محل خم روز  
 به روز بهتر خواهد شد . در صورتی که در محل خم علائم عفونت  
 از جمله گرمي، قرمزي يا ورم وجود داشته باشد و يا خم ترشح  
 دارد ، درد بدترشده و يا درد ناگهاني آغاز شده است ، و نيز اگر  
 تب داريد (حتى اگر خم خوب شده است (فورا به پزشك مراجعه  
 کنيد .

خون ريزی و ترشح از واژن باید رفته رفته کم شود و ممکن است  
 تا ۶ هفته ادامه يابد. ترشح تدریجا به رنگ قرمز روشن و سپس  
 صورتی و پس از آن مایل به سفید تعغير ميکند.

اگر خونریزی نظير قاعدي بيشرت از ۴ روز اول پس از زايمان  
 ادامه يابد و يا بعد از کاهش ، م جدا افزايش يابد به پزشك خود  
 مراجعه کنيد.

وقتي به منزل می رويد استراحت کافی برایتان لازم است با اين  
 حال باید به طور منظم از جا برخاسته و حرکت کنيد راه رفتن  
 پدیده بهبود را تسريع کرده و به پيشگيري از عوارضي نظير لخته  
 شدن خون کمک می کند ولی نباید فعالیت بيش از حد باشد از  
 فعالیت آهسته شروع کنيد و رفته رفته به ميزان آن بيفراييد. از  
 آنجايي که در حال بهبود از يك عمل جراحی شكمي هستيد  
 عضلات شكم شما تا مدتی درد خواهد داشت سخت نگيريد و از  
 بلند کردن چيز هاي سنگين تر از وزن نوزاد تا ۸ هفته پرهيز  
 کنيد

در عرض ۶ تا ۸ هفته قادر خواهيد بود که ميزان متوسطي فعالیت  
 کنيد ولی برای تمرينات بيشرت تا وقتی که پزشك به شما اجازه

باعث می شود که حباب های گاز راحت تر کنار هم جمع شوند  
 و گاز دفع شود اما اگر هم دفع نداده شد حتما اطلاع دهيد تا از  
 خطرات احتمالي جلوگيری شود  
 سعی نکنيد که خودتان به تنهايی از تخت برخizيد، برای اولین  
 بار پرستار باید در کنار شما باشد.

هنگامی که در تخت هستيد با حرکت دادن و کشیدن ساقها و  
 چرخاندن مج پا خون را در ساق پا به جريان بياندازيد .

در روز دوم باید با کمک همسرتان یا پرستار چند بار در اتاق قدم  
 بزنيد. اين امر به گرددش خون در بدن کمک می کند، از تبلی  
 روده ها می کاهد و خطر لخته شدن خون در ساق پا را کاهش  
 می دهد در ابتدا حتی ممکن است رفتن به دستشویی هم غیر  
 ممکن به نظر برسد ولی حرکت کردن در بهبود شما اهمیت  
 زیادي دارد می توانيد برنامه راه رفتن را طوری تنظیم کنيد که  
 پس از دریافت مسکن باشد تا درد کمتری احساس کنيد.

در عرض ۷ تا ۱۰ روز بعد از عمل بخيه ها را خواهند کشيد. اين  
 عمل چند دقیقه بيشرت طول نمی کشد و شما تنها کمی احساس  
 نيشگون گرفتن می کنيد ولی درد ندارد.

پس از ترک بيمارستان به کمک زيادي نياز خواهيد داشت. اگر تا  
 کنون کسی پيشنهاد کمک به شما نکرده است از همسر خود،  
 بستگان و يا دوستان تقاضاي کمک کنيد، انتظار نداشته باشيد  
 که به محض رسیدن به خانه مسکن را کنار بگذاريد. ممکن است  
 تا يك هفته پس از جراحی به مسکن نياز داشته باشد.