



بیمارستان مادر و کودک شوشتری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

شیراز

پارگی زودرس پرده ها

شماره سند: PM-Ed-23-1ed

تهیه کننده:

واحد آموزش سلامت - آذر 1403

تأیید کننده: مدیر خدمات پرستاری مامایی

/سوپروایزر آموزشی

تأیید کننده نهایی: مسئول علمی زنان و زایمان

منبع: ویلیامز

پارگی زودرس پرده چیست؟

خروج مایع از واژن چه به صورت مداوم و چه به صورت یکباره قبل از شروع دردهای زایمانی است.

تشخیص های پارگی زودرس پرده ها :

-مشاهده مستقیم نشت مایع از واژن

-انجام آزمایش بر روی مایع نشت شده

-سونوگرافی که کاهش آب دور جنین را نشان می دهد

علت پارگی زودرس پرده ها (کیسه آب)

-عفونت های دستگاه تناسلی

- التهاب حاد جفت

خطر پارگی زودرس پرده ها در موارد زیر بیشتر است:

-سابقه پارگی زودرس پرده ها در حاملگی قبلی

-شواهد شروع روند زایمان

-سیگار

-سابقه زایمان زودرس

-عفونت باکتریایی واژن

-خونریزی از واژن به ویژه در سه ماهه سوم

عوارض پارگی زودرس پرده ها

-زایمان زودرس

-افزایش احتمال عفونت

-جدا شدن جفت

-بروز مشکلات تنفسی در جنین

علایم خطر:

-افزایش ضربان قلب جنین

-افزایش ضربان قلب مادر

-تب ولرز

-حساس شدن رحم

-ترشحات بد بو و چرکی

اقداماتی که انجام می شود:

-تجویز دارو جهت رسیدگی ریه جنین

-دادن آنتی بیوتیک به مادر جهت جلوگیری از عفونت داخل

رحمی

-بررسی تعیین بلوغ ریه جنین



-بستری مادر تا 34هفتگی وادامه یا ختم حاملگی بستگی به سن حاملگی ونظر پزشک وآزمایشات بیمار دارد

-چک علایم حیاتی مادر وبررسی مادر از نظر تب وافزایش ضربان قلب ودرد رحمی -ترشحات بد بو -عفونت خون

اقداماتی که مادر باید در چنین مواردی انجام دهد:

-درصورت بروز ترشحات چرکی وبودار -آبریزی -سوزش وخونریزی-درد پهلو سریعا به پزشک مراجعه کنید .

-آنتی بیوتیک تجویز شده را در زمان تعیین شده استفاده نمایید
-درصورت حساس ودردناک بودن شکم وتب به پزشک مراجعه نمایید.

-رعایت بهداشت فردی

-چک حرکت جنین

-پیگیری سونوگرافی -نوار قلب جنین و آزمایشات که توسط پزشک تجویز میشود.